



595. INFLUENCIA DE LAS COMORBILIDADES EN LA UBICACIÓN, ESTANCIA MEDIA Y MORTALIDAD DEL PACIENTE EPOC AGUDIZADO QUE REQUIERE INGRESO HOSPITALARIO

Lacárcel Bautista C, López López M, Vílchez Parras A, Pérez Chica G.

OBJETIVO:

Las comorbilidades son muy frecuentes en la EPOC y pueden comportar problemas en el diagnóstico y tratamiento. La mortalidad es con frecuencia debida a causas no respiratorias. Por ello nos planteamos el siguiente objetivo: valorar la influencia de las comorbilidades en la ubicación (Medicina Interna/Neumología), estancia media (EM) y su impacto en la mortalidad.

MATERIAL Y MÉTODOS:


Estudio de cohortes retrospectivas, por revisión sistemática de historias clínicas de los pacientes con exacerbación aguda de EPOC (EAEPOC) que estuvieron ingresados en el Hospital de Jaén entre 01/02/2015-30/08/2015.

Se recogieron variables sociodemográficas y clínicas descritas en el apartado siguiente.

RESULTADOS:

Se reclutaron 164 pacientes, 153 varones (93%), con una edad media de 76,14 años (+/- 9,7 años). El 52% presentaban ≥ 2 comorbilidades siendo la mas frecuente la HTA (VER TABLA 1).

Tabla 1




El 71% de los pacientes que fallecieron tenían ≥ 2 comorbilidades (p 0,033). Al realizar la correlación entre mortalidad y cada una de ellas no había diferencias e.s salvo con la FA (p 0,001), el 42% de los fallecidos tenían FA. No hubo diferencias e.s entre la EM según las comorbilidades (p 0,440).

Tabla 2

| UBICACIÓN | NEUMOLOGÍA | MEDICINA INTERNA | GLOBAL |
|-------------------------|------------|------------------|-----------|
| Nº DE CASOS | 104 | 60 | 164 |
| ESTANCIA MEDIA | 8.06 días | 13.8 días | 9.94 días |
| ≥ 2 COMORBILIDADES | 44% | 65.5% | 52% |
| MORTALIDAD | 10.6% (21) | 35% (11) | 19% (32) |

COMORBILIDADES SEGÚN UBICACIÓN



Se comparó la ubicación con una serie de parámetros que se detallan en la TABLA 2 mediante el test de Chi cuadrado con correlación de Yates encontrando relación e.s entre la ubicación y la presencia de ≥ 2 comorbilidades (p 0,015) y entre la ubicación y la EM siendo mayor en MI (p 0,021).

CONCLUSIONES:

- 1.- La mayoría de los pacientes que ingresan por EAEPOC lo hace en Neumología, no obstante, los pacientes con ≥ 2 comorbilidades ingresan con más frecuencia en Medicina Interna, que presenta mayor estancia media.
- 2.- En nuestra serie no hay diferencias estadísticamente significativas entre estancia media y la presencia de ≥ 2 comorbilidades.
- 3.- La supervivencia está influenciada por las comorbilidades, encontrando significación estadística entre la asociación de FA y mortalidad.