



CAT ¿HAY DIFERENCIA SEGÚN LA FORMA DE REALIZARLO?

Gómez Parras, B.O; Rodríguez López, D.P; Hidalgo Sánchez, M; Bellido Maldonado, A; Saiz Rodrigo, E.; Cano Lucena, P.; Jiménez Arroyo, M; Caamaño Orta, M; Riesco Miranda, J.A.

INTRODUCCIÓN

La evaluación de la calidad de vida es fundamental en la valoración de la respuesta al tratamiento en enfermos con EPOC. El CAT es una herramienta accesible cuyo uso permite objetivar síntomas asociados a esta enfermedad.

OBJETIVOS


Valorar la concordancia de las respuestas en el cuestionario CAT según forma de administración: paciente o enfermería. Estudiar si hay diferencia según hábito tabáquico.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio transversal
período tiempo 2 m
pacientes EPOC
Cuestionario CAT a) autoadministrado
b) Administrado por enfermería

Variables cuestionario CAT

A) tos
B) cantidad de expectoración
C) opresión en el pecho
D) sensación de falta de aire al subir escaleras o una pendiente
E) limitación para realizar actividades domésticas
F) seguridad al salir de casa pese a la afección pulmonar
G) dormir
H) energía



F ACTIVOS EXFUMADORES

CAT	CAT TOTAL	15.64		CAT TOTAL	18.78
Tos	A	2.39	<	a	2.42
Flemas	B	1.64	<	b	2.69
Opresión torácica	C	1.36	<	c	1.66
Disnea	D	3.61	=	d	3.61
Limitación física	E	1.72	<	e	2.56
Seguridad	F	1.17	<	f	1.63
Dormir	G	1.44	<	g	1.84
Energía	H	2.31	<	h	2.36

*Puntuación media del cuestionario de calidad de vida (CAT) en fumadores (izquierda) y exfumadores (derecha).

RESULTADOS

100 p: 90 v (90%) edad media 68.61
10 m (10%), edad media 63.05.
Tabaquismo: F: 36 (36%): 31% v
80% m.
EF: 64 (64%).
Del total (100), 24% coincidencia entre observadores.
Mayor coincidencia interobservador
Tos(a). Disnea (d). Dificultad para dormir(g)
Mayor discrepancia
Limitación física(e). Expectoración(b) Seguridad al salir a la calle (f)

Fumador	F	C	G	B	E	H	A	D
Exfumador	f	c	g	h	a	e	b	d

*Clasificación de cada síntoma de menor a mayor puntuación media entre FA Y EF

Enfermera	1.46	1.55	1.70	2.25	2.31	2.34	2.41	3.61
	C	F	G	E	B	A	H	D
Paciente	1.39	1.21	1.47	2.04	2.16	2.29	2.30	3.56

*Clasificación de cada síntoma de menor a mayor puntuación media .Denfermería/paciente

La concordancia ítem a ítem es moderada (poco mayor de 0.5).

El valor p indica que el valor de la concordancia es, desde el punto de vista estadístico, significativamente mejor que el que podríamos encontrar por azar.

ítem	A	B	C	D	E	F	G	H
KAPPA	0,666	0,55	0,538	0,642	0,51	0,522	0,622	0,584
P-VALOR	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001

CONCLUSIONES

- 1) Existe concordancia moderada entre las variables del CAT medida por enfermería y las obtenidas de forma autoadministrada al paciente.
- 2) No existen diferencias según el hábito tabáquico.