



ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS DEPENDENCIAS PSICO-SOCIALES ENTRE FUMADORES CON PATOLOGIA PSIQUIÁTRICA Y SIN PATOLOGIA ASOCIADA.

Villar Laguna C, Jiménez Ruiz CA, Pascual Lledó JF, Cícero Guerrero A, Mayayo Ulibarri M, Cristóbal Fernández M, Solano Reina S*, de Granda Orive JI**, Iglesias Sanz A

Unidad Especializada en Tabaquismo. Comunidad de Madrid. Madrid.

*Unidad de tabaquismo. Centro de Especialidades Hermanos Sangro. Madrid

**Servicio de Neumología. Hospital 12 de octubre. Madrid.


OBJETIVOS

Comparar las diferentes dependencias psico-sociales del tabaquismo en dos grupos de fumadores que acuden a una Unidad Especializada en Tabaquismo (UET) para dejar de fumar. Un grupo de fumadores sin patología asociada (grupo A) y otro grupo de fumadores con enfermedades psiquiátricas (Grupo B).

MÉTODOS

Se analizaron las diferentes dependencias psico-sociales (fumar por estimulación, fumar por sedación, automatismo, dependencia social, dependencia psicológica y dependencia gestual); en dos grupos de fumadores, una que incluye un total de 201 sujetos sin patología asociada (grupo A) y otra que incluye a un total de 381 sujetos con enfermedad psiquiátrica (Grupo B) que acudieron a una UET para dejar de fumar.

ESTUDIO COMPARATIVO



| Grupo | A (sin patología asociada) | B (con enfermedad psiquiátrica) |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Nº sujetos | 201 | 381 |
| Estimulación | 5,95 | 6,19 |
| Automatismo | 5,53 | 5,82 |
| Dependencia psicológica | 7,75 | 8,26 |
| Dependencia gestual | 4,26 | 4,46 |
| Sedación | 6,37 | 6,78 |
| Dependencia social | 9,49 | 10.42 |

- Fumar por sedación era más alto en el grupo de enfermos que en el de sanos ($p > 0.01$).
- La dependencia social era más alta en los fumadores con patología psiquiátrica ($p > 0.02$).
- En el resto de variables no había diferencias significativas entre los dos grupos.

□ Estos resultados sugieren que los fumadores con enfermedades psiquiátricas consumen tabaco por sedación más que por estimulación y tienen más alto grado de dependencia social que los fumadores sanos.

CONCLUSIONES

