



CONOCIMIENTO DE LA EPOC EN POBLACIÓN GENERAL EN NUESTRA ÁREA.

A. Bellido Maldonado¹; M. Hidalgo Sánchez¹; M. Turégano Yedro²; E. Saiz Rodrigo¹; P. Cano Lucena¹; B.O. Gómez Parras¹; D.P. Rodríguez López¹; M. Orta Caamaño¹; M. Jiménez Arroyo¹; J.A. Riesco Miranda¹.

¹ Servicio de Neumología. Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.

² Servicio de Medicina familiar y comunitaria. Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.

Introducción

El infradiagnóstico de la EPOC supera el 70%, lo cuál se relaciona con el escaso conocimiento que tiene la población general sobre esta entidad.


Objetivos

Conocer el grado de conocimiento de la EPOC en nuestro medio y estudiar el perfil de la población que afirma conocer esta enfermedad.

Material y métodos

Estudio epidemiológico transversal. Realizado mediante una encuesta anónima y autoadministrada en población que acude a su médico de atención primaria. Se recogen ítems que incluyen: edad, sexo, tabaquismo, clínica respiratoria, espirometría y conocimiento de la EPOC.

Resultados



	Población general	Población conocedora de EPOC
Clinica respiratoria	25,5%	32%
Espirometría	23,8% *	47%

*El 50,3% desconoce la prueba.

Conclusiones

- La prevalencia del conocimiento de la EPOC en nuestro medio es del 17%, cifra que se superpone a los datos de estudios poblacionales publicados en la literatura.
- El perfil de población conocedora de la EPOC corresponde a mujer de edad media, con antecedentes de tabaquismo y que refiere informarse a través de amigos, familiares o compañeros de trabajo.
- La influencia por parte de los profesionales sanitarios sobre esta enfermedad es mínima en su conocimiento.