

CARCINOMA BRONCOGENICO Y ALGUNOS FACTORES ASOCIADOS.



Oliveri Aruete, Filomena; Candelario Cáceres, Ariela; Gómez Arenas, A; Fernández Jorge, M^o Á.
 Complejo Asistencial Universitario de Palencia.


OBJETIVO: Analizar las características del cáncer de pulmón, su asociación con el tabaquismo; así como la estirpe histológica, síntomas, estadio y tratamiento más frecuente.

METODOLOGIA:


- Estudio retrospectivo, descriptivo y observacional. Pacientes con Dx de CA pulmonar desde Ene/14-Oct/15.
- Recogida de datos → Sistema de codificación del hospital y revisión de historias clínicas.
- Estudio estadístico → SPSS versión 20.0.

RESULTADOS:

Edad media 72 a (DS +/-11)



- Fumadores 44.4%
- Exfumadores 48.1%
- Nunca fumadores 7.4%



Metástasis (50,2%)	Estadio	Antecedentes de CA (23,7%)
• Múltiples 21,5%	• IV 38,5%	• Colon 6%
• Digestivas 8,9%	• IIIB 12,6%	• Próstata 6,3%
• Pulmón 8,9%	• IIIA 12,6%	• Base de lengua 3%

- Estirpe histológica → **Adenocarcinoma 31.1%**.
- Tabaquismo se asoció → **Epidermoide 31.2%**
- Mortalidad → 63.7% (28.8% en < 3 meses).

CONCLUSIONES:

- Predominio Masculino, Px de edad avanzada y exfumadores.
- **Adenocarcinoma** → Estirpe mas frec.
- **Epidermoide** → Asociado al tabaquismo.

- En 1 y 10 m fallecieron 63.7%.
- 28.8% en < 3 meses tras el Dx.