



CÁNCER PLEURO-PULMONAR Y EXPOSICIÓN LABORAL ¿VALORAMOS ALGO MÁS QUE EL TABAQUISMO?

Jimenez, I.; López, V.; López, X.; Mosquera, C.; Cascante, JA; Marín, B.; Cebollero, P.; Hueto, J.
Servicio de Neumología, Complejo Hospitalario de Navarra



INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El factor de riesgo más claramente reconocido en la génesis del cáncer de pulmón (CP) es el tabaquismo; no obstante, diversos estudios consideran que, hasta en un 9-15% de los casos, podría tener un origen ocupacional.

Nuestro **objetivo** fue analizar si existe suficiente reconocimiento de este hecho y si así se hace constar en los informes médicos emitidos de pacientes diagnosticados de CP o Mesotelioma Pleural (MP).

MATERIAL Y MÉTODOS


Realizamos un análisis retrospectivo de los informes médicos emitidos de pacientes diagnosticados de CP o MP en Navarra y que fueron presentados en el Comité Multidisciplinar de Cáncer de Pulmón de nuestra comunidad durante los años 2012 a 2014.

Se analizaron los antecedentes personales recogidos de hábito tabáquico, laborales y de exposición a agentes laborales implicados en la génesis del CP y MP, y los comparamos con los obtenidos en un estudio similar realizado durante los años 2004 y 2005.



RESULTADOS

317 pacientes con diagnóstico de CP o MP

- Edad: 65,2 años (31–87)
- Sexo: 232 varones (73,19%); 85 mujeres (26,8%)
- Diagnósticos: 309 CP (97,48%); 8 MP (2,52%)
- Profesiones (n=145):



- Agente ocupacional MP (n=7):



	2004-2005	2012-2014
PREVALENCIA CP MUJERES	12,04%	26,8%
AP LABORAL	43,78%	45,74%

CONCLUSIONES

- ✓ A diferencia de lo que ocurre con el tabaquismo, se detecta una clara infradeclaración de los agentes ocupacionales y de la exposición laboral en los informes médicos. De hecho, no hemos experimentado una mejoría significativa respecto a los resultados obtenidos en el estudio realizado entre los años 2004 y 2005.
- ✓ Entre las profesiones implicadas hay un alto porcentaje que puede constituir, por los agentes que manejan, un claro factor de riesgo en la génesis del CP y el MP.
- ✓ La prevalencia de CP en las mujeres ha aumentado.
- ✓ Es importante tener presente la implicación de la exposición laboral en la génesis del CP y el MP para poder implantar un mayor número de medidas preventivas o establecer compensaciones económicas para los diagnosticados.