



INTRODUCCIÓN:

- La variabilidad en la práctica de los diferentes profesionales hace necesaria la creación de guías. Con este trabajo se pretende conocer la situación del manejo de la neumonía adquirida en la comunidad en nuestro centro

OBJETIVO:

El objetivo era evaluar el abordaje diagnóstico y terapéutico en pacientes hospitalizados por neumonía adquirida en la comunidad, analizando en los informes de alta parámetros de calidad publicados previamente (1).

METODOLOGÍA:

Estudio observacional retrospectivo.

- Criterios de inclusión: diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad (informes de alta o éxitus) en los últimos 5 años.
- Criterio de exclusión: imposibilidad de recuperar datos.

Para el cálculo del tamaño muestral, se asumió el cumplimiento de las guías en el 80%, con un error del 5%, nivel de confianza del 95% y un 5% de datos irrecuperables. La selección de la muestra se realizó mediante un programa de generación de números aleatorios.


RESULTADOS:

PACIENTES:




- Edad: 58 + 16,84 años
- Estancia media: 12 + 10,18 días

COMORBILIDADES:



INDICADORES:



CONCLUSIONES:

En los informes de alta, quedan reflejados, en un alto porcentaje, el cumplimiento de los criterios de calidad indicados en las guías. Un aspecto a mejorar es hacer referencia a los índices de gravedad (PSI y CURB65) como criterios de hospitalización.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- 1.- Niederman MS, Mandell LA, Anzueto A, Bass JB, Broughton WA, Campbell GD, et al. Guidelines for the management of adults with community-acquired pneumonia. Diagnosis, assessment of severity, antimicrobial therapy, and prevention. Am J Respir Crit Care Med. 2001 Jun; 163(7): 1730-54.